

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ



ИНСТРУКЦИЯ  
по применению Уролекс капель урологических  
для профилактики и лечения мочекаменной болезни, острых и хронических  
заболеваний мочевыводящих путей и почек у собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,  
Россия, 129329, Москва, Кольская ул., д.1, стр.1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Уролекс капли урологические (*Urolex guttae urologicae*).

Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: не присвоено.

2. Лекарственная форма: раствор для орального применения.

Уролекс капли урологические в 1 мл в качестве действующих веществ содержат сухой экстракт листьев березы (*Betula pubescens*) – 25 мг, сухой экстракт листьев толокнянки (*Arctostaphylos uva-ursi*) – 25 мг, сухой экстракт травы хвоща полевого (*Equisetum arvense*) – 25 мг, сухой экстракт травы золотарника канадского (*Solidago canadensis*) – 25 мг, а в качестве вспомогательных веществ глицерин дистиллированный и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой жидкость от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета. При хранении допускается образование небольшого осадка, исчезающего при встряхивании.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 18 месяцев со дня производства.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 5, 10, 15, 20, 25 мл во флаконы из темного стекла или в полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные крышкой с контролем первого вскрытия или снабженные крышкой-капельницей и укупоренные крышкой с контролем первого вскрытия; по 50, 100 мл во флаконы из темного стекла, укупоренные крышкой с контролем первого вскрытия или резиновыми пробками, укрепленные алюминиевыми колпачками или в полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные крышкой с контролем первого вскрытия.

Флаконы с препаратом индивидуально упаковывают вместе с инструкцией по применению в картонные пачки. В каждую пачку допускается вложение мерного стаканчика или шприца-дозатора для флаконов, не снабженных крышкой-капельницей.

5. Хранят Уролекс капли урологические в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°С до 30°С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Уролекс капли урологические относятся к комплексному растительному лекарственному препарату.

10. Входящие в состав Уролекса капель урологических экстракты лекарственных растений оказывают мочегонное, противовоспалительное, антибактериальное, кровоостанавливающее и обезболивающее действие, снижают вероятность образования кристаллов солей в мочевом пузыре.

Экстракт листьев березы обладает мягким диуретическим действием.

Экстракт листьев толокнянки обладает мочегонным, противовоспалительным и противомикробным свойствами.

Экстракт золотарника проявляет диуретический и спазмолитический эффекты, препятствуя фиксации микрокристаллов в мочеточниках и мочевом пузыре и их дальнейшему росту.

Сочетание противовоспалительного, диуретического эффекта со специфическим действием кремневой кислоты, содержащейся в экстракте хвоща полевого, приводит к снижению вероятности образования и дальнейшего роста кристаллов солей (фосфатов, оксалатов и уратов) в мочеточниках и мочевом пузыре, что предотвращает рецидивы мочекаменной болезни у собак и кошек.

По степени воздействия на организм Уролекс капли урологические относятся к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Уролекс капли урологические применяют в комплексной терапии острых и хронических заболеваний нижних мочевыводящих путей (циститы, уроциститы) и почек (пиелонефриты, гломерулонефриты) собак и кошек, а так же для лечения и профилактики рецидивов мочекаменной болезни.

12. Противопоказанием к применению Уролекс капель урологических является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата.

13. Уролекс капли урологические применяют перорально на корень языка или в защечный мешок за 1 час до кормления животного в дозе 0,1 мл (3 капли) на 1 кг массы животного 3 раза в день.

Лекарственный препарат можно смешивать с небольшим количеством воды.

Перед применением раствор во флаконе следует тщательно взболтать.

Продолжительность курса лечения не должна превышать одного месяца.

14. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Уролекс капли урологические применяют животным в период беременности и лактации, щенкам и котятм с осторожностью под контролем ветеринарного врача.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозы



лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

18. При применении препарата Уролекс капли урологические в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

19. Сведения о взаимодействии с другими лекарственными препаратами отсутствуют.

20. Уролекс капли урологические не предназначены для применения продуктивным животным.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом Уролекс капли урологические следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Уролекс каплями урологическими. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Уролекс капель урологических, утвержденная Россельхознадзором 20 июня 2014 года.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Мос-  
ковская область, г. Сергиев Посад, ул.  
Центральная, д. 1.

Наименование и адрес  
организации, уполномоченной  
держателем или владельцем  
регистрационного удостоверения  
лекарственного препарата на  
принятие претензий от потребителя

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,  
Московская область, г. Сергиев Посад,  
ул. Центральная, д. 1.

Номер регистрационного удостоверения: 44-3-6.16-3215-ПВР-3-3.0/02650