



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
ООО «НВЦ АгроВетЗАЩИТА»  
С.В. Енгашев  
"AVL Ltd" 2018 г.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
по применению фунгицидного средства ФУМИКЛИН раствор для противо-  
грибковой дезинфекции объектов ветнадзора  
(Организация-изготовитель: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,  
Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., д. 1)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ФУМИКЛИН раствор – фунгицидное средство, предназначенное для противогрибковой дезинфекции объектов ветнадзора, в том числе животноводческих и птицеводческих помещений, транспортных средств и оборудования.
2. ФУМИКЛИН раствор в качестве фунгицидного компонента содержит энилконазол – 150 мг/мл, а также вспомогательные вещества. По внешнему виду средство представляет собой жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с коричневатым или коричневым оттенком.
3. Выпускают ФУМИКЛИН раствор расфасованным по 100 и 200 мл в полимерные флаконы; по 0,5 и 1,0 л в полимерные бутылки и по 5 л в полимерные канистры. Допускается комплектация упаковочных единиц мерным стаканчиком.
4. Упаковку маркируют с указанием: организации - изготовителя, названия, назначения, способа применения, количества средства в упаковке, состава, номера серии, срока годности, условий хранения, надписи «Для противогрибковой дезинфекции в ветеринарии», «Не является лекарственным средством», обозначения СТО.
5. Хранят средство в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 30°C. Срок годности в закрытой упаковке изготовителя – 3 года со дня изготовления. Не применять по истечении срока годности.
6. Хранить в недоступном для детей и животных месте.
7. Неиспользованное средство утилизируют в соответствии с требованиями действующего законодательства.

### II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

8. Фунгицидное средство ФУМИКЛИН раствор обладает широким спектром противогрибкового действия против грибков и дрожжей, включая *Aspergillus spp.*, *Microsporum spp.*, *Trichophyton spp.*, *Candida albicans*, *Cladosporium spp.*, *Alternaria alternata*, *Mucor*, *Trichoderma*.

Механизм действия энилконазола заключается в избирательном ингибировании биосинтеза эргостерина, что приводит к изменению проницаемости клеточной стенки микроорганизмов с последующей их гибелью.

**ФУМИКЛИН** раствор по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых для применения концентрациях не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия, не вызывает раздражение слизистых оболочек. Рабочая эмульсия средства не обладает коррозионной активностью, не портит материалы обрабатываемых поверхностей.

### III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9. **ФУМИКЛИН** раствор применяют для противогрибковой дезинфекции помещений, подстилки, инкубаторов, выводных шкафов, кормушек, клеток, гнезд, поилок, инженерных коммуникаций в птицеводческих и животноводческих помещениях, кролиководческих фермах и конюшнях, обсемененных грибами, включая *Aspergillus spp.*, *Trichophyton verrucosum*, *T. mentagrophytes*, *T. equinum*, *Microsporum canis*, *M. gypseum*.

10. Перед дезинфекцией необходимо провести тщательную механическую очистку помещения, изолировать помещение, выключить вентиляцию. Для обработки используют любое распыляющее устройство (установки холодного или горячего тумана и иные аэрозольные установки) или влажную уборку.

Обработку проводят при отсутствии животных и птиц.

11. Перед разведением содержимое упаковки тщательно встряхивают. Для влажной уборки и крупнодисперсного распыления (ранцевые распылители и т.д.) используют 0,1 % рабочую эмульсию (100 мл средства растворяют в 99,9 литрах воды), при использовании установок горячего или холодного тумана применяют 1% рабочую эмульсию (1 л средства растворяют в 99 литрах воды, подогретой до 40-50°C). Приготовленную рабочую эмульсию следует использовать в течение 30 минут.

В зависимости от профиля поверхности экспозиция составляет от 30 минут до 12 часов (гладкие и шероховатые). Рабочую эмульсию применяют при температуре не ниже 5°C с нормой расхода, указанной в таблице.

Объект обработки	% рабочей эмульсии	Метод обработки	Кол-во рабочей эмульсии	Кратность обработки
Инкубаторы, выводные шкафы	0,1	Влажная уборка, крупнодисперсное распыление	150 мл/м <sup>2</sup> или 30 мл/м <sup>3</sup>	Двукратно с интервалом 48 часов перед инкубацией, а также до и после сбора птенцов
	1	Установки горячего или холодного тумана	15 мл/м <sup>2</sup> или 3 мл/м <sup>3</sup>	
Птичники, конюшни, животноводческие и звероводческие фермы, кормокухни, склады, транспортные средства, подстилка и оборудование	0,1	Влажная уборка, крупнодисперсное распыление	300 мл/м <sup>2</sup> или 80 мл/м <sup>3</sup>	Двукратно с интервалом 48 часов. Кролиководческие фермы обрабатывают 3 раза в неделю с интервалом 48 часов в течение 1-3 недель.
	1	Установки горячего или холодного тумана	30 мл/м <sup>2</sup> или 8 мл/м <sup>3</sup>	

12. **ФУМИКЛИН** раствор допускается смешивать с другими дезинфицирующими средствами для противомикробной и противогрибковой обработки.

13. Допускается проведение локальной противогрибковой обработки отдельных стойл, клеток, единиц оборудования и инвентаря в присутствии жи-

вотных и птицы при наличии интенсивной вентиляции и отсутствия контакта с обработанными поверхностями.

14. По истечении установленной экспозиции обработки кормушки и поилки обмывают водой. С остальных поверхностей смывания остатков средства не требуется. Животных и птиц вводят в помещения после проветривания через 30 минут.

15. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г.).

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

16. К работе с фунгицидным средством ФУМИКЛИН раствор не допускаются лица моложе 18 лет, беременные женщины и лица, имеющие противопоказания для работы с дезинфицирующими средствами.

17. Все работы по приготовлению рабочий эмульсии и применению средства следует осуществлять с использованием спецодежды (халат, головной убор, резиновые перчатки, герметичные защитные очки или защитная маска, респиратор или противогаз). Во время работы запрещается пить, принимать пищу и курить. Запрещается использовать тару из-под средства для пищевых целей.

18. Не допускается попадание средства внутрь организма, на кожу, слизистую оболочку глаз, органы дыхания и слизистые оболочки. После окончания работы следует вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, рот прополоскать. При случайном попадании средства на кожу, место попадания промыть большим количеством теплой водой с мылом; при попадании на слизистую глаз - промыть струей воды, и при необходимости, обратиться к врачу.

При попадании внутрь - выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками активированного угля, вызвать рвоту и обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) во время или после работы с фунгицидным средством ФУМИКЛИН раствор следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку средства.

19. Рекомендации разработаны: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2.