



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «НВЦ Агроветзащита»

С.В. Енгашев  
12  
2019 г.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

по применению фунгицидного средства ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма для противогрибковой дезинфекции объектов ветнадзора

(Организация-изготовитель: ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, Центральная ул., д. 1)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма – фунгицидное средство, предназначенное для противогрибковой дезинфекции объектов ветнадзора, в том числе животноводческих и птицеводческих помещений, транспортных средств и оборудования.

2. ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма в 1 генераторе в качестве активного компонента содержит энилконазол - 10 г, а также вспомогательные вещества.

По внешнему виду средство представляет собой изделие цилиндрической формы без видимых повреждений.

Выпускают средство расфасованным в металлические (жестяные) банки, снабженные запалом, с наклеенной этикеткой.

3. Каждый генератор дыма маркируют с указанием наименования организации-изготовителя и ее логотипа, наименования и назначения средства, рекомендаций по применению, даты изготовления и срока годности, серии, условий хранения, надписи «Не является лекарственным средством», надписи «Для противогрибковой дезинфекции в ветеринарии» и предупредительных надписей и знаков, обозначения нормативного документа, штрихового кода.

4. ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма хранят в закрытой упаковке изготовителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С. Срок годности средства при соблюдении условий хранения – 2 года со дня изготовления.

Не применять по истечении срока годности.

5. Хранить в недоступном для детей и животных месте.

6. Использованные генераторы дыма утилизируют с бытовыми отходами после замачивания в воде в течение 1 часа.

## II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Фунгицидное средство ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма обладает широким спектром противогрибкового действия против грибов, включая *Aspergillus spp.*, *Microsporium spp.*, *Trichophyton spp.*

Механизм действия энилконазола заключается в избирательном ингибировании биосинтеза эргостерина, что приводит к изменению проницаемости клеточной стенки микроорганизмов с последующей их гибелью.

ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма применяют для противогрибковой дезинфекции помещений, подстилки, инкубаторов, выводных шкафов, кормушек, клеток, гнезд, поилок, инженерных коммуникаций в птицеводческих и животноводческих помещениях, кролиководческих фермах и конюшнях, обсемененных грибами, включая *Aspergillus spp.*, *Trichophyton verrucosum*, *T. mentagrophytes*, *T. equinum*, *Microsporium canis*, *M. gypseum*.

9. Перед дезинфекцией необходимо провести тщательную механическую очистку помещения, изолировать помещение, выключить вентиляцию.

Обработку проводят в отсутствие животных и птиц.

10. При проведении обработки следует расчетное количество генераторов дыма разместить на огнеупорную поверхность, открыть крышку и зажечь запал. Один генератор дыма рассчитан на 50 м<sup>3</sup> объема помещения. Экспозиция составляет, в зависимости от профиля поверхности, от 12 до 24 часов (гладкие и шероховатые).

При возможности повторного заражения грибковой инфекцией проводят дополнительные обработки с интервалом 2-3 дня до снятия угрозы обсеменения.

11. Для усиления фунгицидного действия целесообразно сочетать ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма и ФУМИКЛИН® водорастворимый порошок.

12. ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма можно сочетать с другими дезинфицирующими средствами для одновременной противомикробной и противогрибковой обработки.

13. По истечении установленной экспозиции обработки кормушки обмывают водой. С остальных поверхностей смывания остатков средства не требуется. Животных и птиц вводят в помещения после проветривания через 30 минут.

14. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г.).

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

15. При работе с фунгицидным средством ФУМИКЛИН® генератор фунгицидного дыма следует соблюдать общепринятые меры личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с дезинфицирующими средствами (использовать защитные очки, перчатки и респиратор). Генератор дыма легко воспламеняется и быстро становится горячим. Не рекомендуется прикасаться к пустому генератору дыма голыми руками в течение 15 минут после поджигания.

16. Запрещается использовать тару из-под средства для бытовых целей.

17. Рекомендации по применению разработаны: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2.