



# ExpressTabs®

НОВИНКА!



## ЭКСПРЕСС-РЕШЕНИЕ 37 ПРОБЛЕМ

### ТАБЛЕТКИ

от клещей, блох, вшей, круглых и ленточных гельминтов



### ДЛИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

от блох до 56 дней, от клещей до 42 дней



### ЭКСПРЕСС-ДЕЙСТВИЕ

защищает уже через 30 минут<sup>1</sup> после применения



### ОТ 37 ВИДОВ

внешних и внутренних паразитов



### ВКУСНО

таблетки со вкусом мяса нравятся собакам





### МОЖНО КУПАТЬСЯ

защита не смывается при купании и под дождём



### ПИТОМЕЦ БЕЗОПАСЕН

для детей — можно гладить и обнимать любимца



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ



<sup>1</sup>После применения препарата действие против блох, имагинальных форм вшей, чесоточных, тромбидиформных клещей и гельминтов начинается через 30 минут; против иксодовых клещей — через 5 часов.

РЕКЛАМА ООО «АВЗ С-П» Россия, 129329, Москва, Игарский проезд, дом 4, стр. 2 тел.: (495) 648-26-26, help@vetmag.ru

Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).  
Номер регистрационного удостоверения: 77-3-19.22-4915N#ПВП-3-19.22/03754

www.avzvet.ru

**1**

ЭкспрессТабс® применяют животным **СТРОГО во время кормления или сразу после кормления** с небольшим количеством корма (лакомства) или вводят на корень языка. Допускается измельчение таблеток.

**2**

Для чувствительных животных **допускается деление дозы препарата** на две равные части с последующей дачей с интервалом 3-5 часов.

**3**

Необходимо убедиться, что животное проглотило необходимую дозу полностью.

### Таблетки ЭкспрессТабс® дозируют СТРОГО ПО ВЕСУ СОБАКИ.

Терапевтическая доза (по действующим веществам) препарата на 1 кг массы животного составляет: 30 мг спиносада + 5 мг празиквантела + 0,2 мг моксидектина.

#### Детализация «вес-доза» представлена в таблице:

вес животного, кг	для собак весом до 5 кг спиносад — 150 мг, празиквантел — 25 мг и моксидектин — 1 мг (в 1 таблетке)	для собак весом от 5 до 15 кг спиносад — 300 мг, празиквантел — 50 мг и моксидектин — 2 мг (в 1 таблетке)	для собак весом от 15 до 30 кг спиносад — 900 мг, празиквантел — 150 мг и моксидектин — 6 мг (в 1 таблетке)	для собак весом от 30 до 60 кг спиносад — 900 мг, празиквантел — 150 мг и моксидектин — 6 мг (в 1 таблетке)
1,25-2	1/4 таблетки	-	-	-
2,1-3	1/2 таблетки	-	-	-
4-5	1 таблетка	1/2 таблетки	-	-
6-8	1 + 1/2 таблетки	1/2 + 1/4 таблетки	-	-
9-10	2 таблетки	1 таблетка	-	-
11-14	-	1 + 1/4 таблетки	-	-
15	-	1 + 1/2 таблетки	1/2 таблетки	1/2 таблетки
16-20	-	2 таблетки	1/2 + 1/4 таблетки	1/2 + 1/4 таблетки
21-25	-	2 + 1/2 таблетки		
26-30	-	-	1 таблетка	1 таблетка
31-40	-	-	1 + 1/4 таблетки	1 + 1/4 таблетки
41-45	-	-	1 + 1/2 таблетки	1 + 1/2 таблетки
46-60	-	-	2 таблетки	2 таблетки
> 60*	комбинация таблеток с учётом массы животного			

\* При применении препарата собакам массой более 60 кг следует подобрать комбинацию таблеток соответствующих модификаций. Например: для собаки массой 70 кг следует использовать 2 таблетки «Для собак весом от 30 до 60 кг» и дополнительно 1 таблетку «Для собак от 5 до 15 кг».

#### Не применять:

- При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе)
- При истощении, инфекционных заболеваниях, гипертермии (температура тела свыше 39°C), эпилепсии, нарушениях функции печени и почек
- Животным других видов, а также собакам массой менее 1,25 кг, беременным, лактирующим животным и щенкам моложе 8 недельного возраста
- Собакам пород, чувствительных к макроциклическим лактонам: австралийская овчарка (аусси), белая овчарка, бобтейл (староанглийская овчарка), бордер-колли, колли короткошерстный, колли длинношерстный, макнаб, уиппет длинношерстный, шелковистый виндхаунд, шелти и их метисы, а также собакам с генетически обусловленной повышенной чувствительностью (MDR1-недостаточностью)
- В течение 6 недель после последней противопаразитарной обработки животного препаратами, содержащими спиносад и макроциклические лактоны, в том числе моксидектин, абамектин, аверсектин, дорамектин, ивермектин, мильбемицин и эприномектин.

<sup>2</sup> Подробный способ применения: см. в инструкции по применению препарата ЭкспрессТабс® (листок-вкладыш).